

Epidémie de gastro-entérites à Norovirus

Désinfection des mains	<ul style="list-style-type: none"> Lors d'épidémie à Norovirus, privilégier la désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique à base d'éthanol comme par exemple : Stérillium® Virugard, Skinman® Intensiv, Softa-Man® acute, Desderman® N, Stérillium® Gel
Désinfection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Dismozon® (oxygène actif) ou Eau de Javel 2% (à diluer pour atteindre une concentration de 0,5% à 1%) pour le nettoyage des surfaces mobiles et fixes y compris les sanitaires désinfecter l'environnement bi-quotidiennement
Traitement du linge	<ul style="list-style-type: none"> transporter le linge dans un sac en plastique, imperméable et hermétiquement fermé laver le linge en machine à une température > à 60°C ajouter au produit à lessive un produit désinfectant pour les textiles ne pouvant être lavés à des températures > à 60°C (oxygène actif ou autre désinfectant pour textile) <p>Remarque : pour les textiles ne pouvant être lavés qu'à sec, l'OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) propose de les entreposer séparément pendant 14 jours dans un sac hermétiquement fermé avant leur prise en charge.</p>
Isolement de contact	<ul style="list-style-type: none"> maintenir le résident en chambre maintenir les Mesures Additionnelles de contact 48h après la fin des symptômes
Mesures pour le personnel	<ul style="list-style-type: none"> évincer immédiatement tout personnel présentant des symptômes de gastro-entérite ceci jusqu'à 48 h après la fin de leurs symptômes
Déclaration de l'épidémie	<ul style="list-style-type: none"> annoncer l'épidémie au Médecin cantonal avertir la cellule régionale HPCI